



## ACTICOAT<sup>®</sup>

с нанокристаллами SILCRYST™

Анти микробная абсорбирующая повязка с  
серебром

### СТЕРИЛЬНО

Радиационный  
метод стерилизации.

Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки.  
Предназначено только для одноразового использования. Повторная  
стерилизация не допускается. Хранить в сухом месте при температуре не выше  
25°C/77°F. Избегать воздействия света и температуры выше 50°C/120°F.

### Описание

Анти микробная защитная повязка ACTICOAT™ состоит из трех слоев:  
внутреннего абсорбирующего вискозно-полиэфирного слоя и двух наружных  
слоев из полиэтиленовой не прилипающей сетки с анокристаллами  
серебра. ACTICOAT – это абсорбирующая раневая повязка, которая  
помогает регулировать влажную среду на поверхности раны. Повязка имеет  
атравматический нижний слой, который не прилипает к раневой поверхности,  
что позволяет свести к минимуму возможность травматических повреждений  
при смене повязки. Нанокристаллы серебра обеспечивают эффективную  
защиту от контаминации патогенными микроорганизмами из окружающей  
среды, способствуя быстрейшему заживлению раны. Нанокристаллическое  
серебро защищает рану и от микробов, присутствующих в ране, снижая риск ее  
вторичного инфицирования. ACTICOAT сохраняет анти микробные свойства в  
течение 3 суток.

### Показания к применению

ACTICOAT рекомендуется использовать в качестве абсорбирующей  
анти микробной повязки при лечении поверхностных и глубоких ран,  
включая пролежни, венозные трофические язвы, диабетические язвы,  
ожоги, реципиентные участки при пересадке кожи. ACTICOAT может  
также использоваться для инфицированных ран. При использовании в  
инфицированных ранах необходимо определение возбудителя инфекции и  
лечение согласно принятому клиническому протоколу.

### Противопоказания

- Не применять у пациентов с повышенной чувствительностью к серебру.
- Не применять у пациентов, во время проведения магнитно-резонансной  
томографии (МРТ).
- Пред проведением радиационной терапии повязку следует удалить. Новую

повязку можно накладывать в плановом порядке.

### Меры предосторожности

- Не увлажнять для использования на местах введения катетера.
- Только для наружного применения.
- Повязка ACTICOAT не совместима с препаратами на масляной основе, такими  
как вазелин.
- Избегать контакта повязки с электродами или токопроводящими гелями во  
время электронных измерений, например, при ЭЭГ и ЭКГ.
- Не использовать при изменении цвета повязки.
- Поступали сведения о возникновении временной боли при использовании  
ACTICOAT. Вероятность возникновения болевых симптомов можно  
минимизировать, следуя инструкции по применению. Если боль была  
длительной, снимите повязку и прекратите её использование.
- ACTICOAT следует использовать для лечения недоношенных детей (менее  
37 недель беременности) только в том случае, когда польза от применения  
продукта превышает потенциальный риск. Данные клинических исследований  
для этой группы детей отсутствуют, есть лишь ограниченные сведения по его  
использованию для доношенных новорожденных.

### Инструкция по применению:

- Извлеките повязку ACTICOAT из упаковки, сохраняя стерильность.
- Смочите поверхность повязки водой для инъекций (НЕ используйте  
физиологический раствор). Удалите излишки воды до аппликации, положив  
повязку на стерильную поверхность на 2 минуты.
- При необходимости смоделируйте повязку по форме раны.
- Наложите повязку на поверхность раны.
- Зафиксируйте повязку ACTICOAT вторичной повязкой, которая будет  
поддерживать влажную раневую среду. При большом количестве экссудата в  
ране, используйте абсорбирующую вторичную повязку, при этом пленочные  
покрытия не рекомендуются.
- Сохраняйте повязку влажной, но не настолько, чтобы вызвать мацерацию кожи.
- Меняйте повязку в зависимости от количества экссудата и состояния раны.  
Повязку рекомендуется менять не реже 1 раза в 3 суток.
- При высыхании или прилипании повязки

к ране, смочите или промокните повязку,  
чтобы легче её снять и не травмировать  
заживающую рану.

Примечание: ACTICOAT может  
вызвать транзиторное изменение цвета  
окружающей кожи.

### Ассортимент

Код	Размер	Штук в упаковке
66000808	5см x 5см / 2" x 2"	5
66000789	10см x 10см / 4" x 4"	5
66000791	10см x 10см / 4" x 4"	12
66000792	10см x 20см / 4" x 8"	12
66000793	20см x 40см / 8" x 16"	6
66000794	40см x 40см / 16" x 16"	6
66000795	10см x 120см / 4" x 48" "- дюймы	6

### Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN, Англия

Товарные знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 12/2013

Номера патентов: US 5681575, 5753251, 5770255, 5837275

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)